$(6^4)^2$	$6^{10}\cdot 6^{-2}$	$6^6\cdot 6^2$
e	s	a
$(6^4)^2$	$6^{10}\cdot 6^{-2}$	$6^6\cdot 6^2$
$8^{-2}\cdot 8^{14}$	$8^5\cdot 8^7$	$3^8\cdot 2^8$
b	n	t
$8^{-2}\cdot 8^{14}$	$8^5\cdot 8^7$	$3^8\cdot 2^8$
$36^3\cdot 36$	$4^{12}\cdot 2^{12}$	$(8^4)^3$
h	g	x
$36^3\cdot 36$	$4^{12}\cdot 2^{12}$	$(8^4)^3$

$3^4 \cdot 12^4$ & $3^4 \cdot 12^4$	$(36^2)^2$ k $(36^2)^2$	$36^7 \cdot 36^{-3}$ z $36^7 \cdot 36^{-3}$
$(64^3)^2$ q $(64^3)^2$	$\frac{64^9}{64^3}$ y $\frac{64^9}{64^3}$	$64^3 \cdot 64^3$ i $64^3 \cdot 64^3$
 * 	 * 	$4^6 \cdot 16^6$ w $4^6 \cdot 16^6$

$6 \cdot 6^3$		
r	*	*
$6 \cdot 6^3$		
$2^4 \cdot 3^4$	$(6^2)^2$	$\frac{6^7}{6^3}$
u	d	m
$2^4 \cdot 3^4$	$(6^2)^2$	$\frac{6^7}{6^3}$
$(36^2)^4$	$36^{12} \cdot 36^{-4}$	$36^6 \cdot 36^2$
#	f	c
$(36^2)^4$	$36^{12} \cdot 36^{-4}$	$36^6 \cdot 36^2$

$9^8 \cdot 4^8$ o $9^8 \cdot 4^8$	$8 \cdot 8^5$ l $8 \cdot 8^5$	$\frac{8^{10}}{8^4}$ v $\frac{8^{10}}{8^4}$
$(8^2)^3$ p $(8^2)^3$	$2^6 \cdot 4^6$ j $2^6 \cdot 4^6$	**Anzahl Spieler:** 2-4 **Spielvorbereitung:** • Die Karten werden gut gemischt. • Jeder Spieler erhält 6 Karten. • Die restlichen Karten werden als verdeckter Stapel in die Mitte gelegt, die oberste Karte des Stapels wird aufgedeckt.

Spielanleitung:

- Der Spieler, der an der Reihe ist versucht von seinen Karten eine passende auf die offen liegende Karte zu legen. Passend ist eine Karte dann, wenn sie entweder den selben Potenzwert darstellt oder aber der dargestellte Term sich mit der gleichen Potenzregel vereinfachen lässt. Hat der Spieler keine passende Karte, so zieht er eine Karte vom verdeckten Stapel und der nächste Spieler ist an der Reihe.
- Wird eine Karte mit dem Symbol gelegt, so muss der Spieler, der als nächstes an der Reihe ist zwei Karten vom verdeckten Stapel ziehen und setzt aus.
- Wird eine Karte mit dem Symbol gelegt, so muss der Spieler, der als nächstes an der Reihe ist aussetzten.
- Eine Karte mit dem Symbol kann zu jeder Zeit gelegt werden. Der Spieler, der die Karte ausspielt kann sich eine Potenzregel wünschen zu der die nächste Karte, die abgelegt wird passen muss.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
2019 Henrik Horstmann

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞

$3 \cdot 4^{-1}$ e^{x} $\frac{3a+b}{c}$ $\ln z$

$\int f(x)\,dx$ $3a^2b+4c$

$(a+b)^2$ $x_{1,2} = \pm\sqrt{n}$ $(-1)^n n!$ $e^{i2\pi}$

$\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n}$ $\sum_{i=1}^{n} 2^i g \cdot 4$ $\frac{n^2+1}{n^2-1}$ $\sqrt[n]{2}$ $\sqrt[n]{M}$

$\left[(x-1)^2\right]$ $\sqrt{e^2+2e}$ $x^2 = -1$ $\ln(x)$ $3{,}14$

Dalšího $\int_a^b (f(x)-h(x))\,dx$ $\cos(\pi x)$ ∞